

Kenmerk: ZN-SP-2024-002
Betreft: Standpunt inzake de behandeling van hypereosinofiel
syndroom (HES) met mepolizumab
Datum: Januari 2024

=====

Inleiding

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft voor een aantal behandelingen met dure, specialistische geneesmiddelen standpunten geformuleerd ten aanzien van de instellingen die een dergelijke behandeling willen aanbieden. De standpunten worden opgesteld door de CieBAG (de ZN-Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen) in samenspraak met de wetenschappelijke vereniging behorende bij het betreffende indicatiegebied. Zorgverzekeraars kunnen bij de inkoop gebruik maken van deze standpunten.

Standpunt inzake de behandeling van HES met mepolizumab

IL5-remmers kunnen worden ingezet bij de behandeling van HES. Op dit moment is alleen mepolizumab geregistreerd voor de behandeling van HES.

Indicatie: *Als aanvullende behandeling van inadequaet gecontroleerd hypereosinofiel syndroom (HES) bij volwassenen, zonder identificeerbare niet-hematologische secundaire oorzaak.*

De CieBAG adviseert om HES, gezien de zeldzaamheid van de aandoening (ca. 40 nieuwe patiënten per jaar) en de expertise die voor deze behandeling vereist is, uitsluitend in een academisch ziekenhuis te behandelen.

Niet-academische instellingen die deze behandeling willen geven, kunnen een gemotiveerd verzoek indienen via kwakeitscriteria@zn.nl. Hierin moet vermeld staan waarom zij hun patiënt(en) zelf willen behandelen en niet willen/kunnen doorverwijzen. In het verzoek moet ook aangegeven worden op welke manier zij het MDO voor deze aandoening met een academisch centrum hebben vormgegeven. Zowel voor de indicatiestelling als voor afspraken wanneer de ziekte weer opvlamt, moeten er duidelijke afspraken binnen een MDO gemaakt zijn.

Toelichting op het standpunt

De geschatte prevalentie van HES is 1,5 per 100.000 personen. Dat zou voor Nederland betekenen dat er tussen de 250 en 300 patiënten met HES zouden zijn. Niet alle patiënten hoeven met mepolizumab te worden behandeld. Een belangrijk deel zal met bijvoorbeeld corticosteroïden behandeld worden. Een deel zal chemotherapie moeten krijgen omdat ze een secundaire variant hebben. Er wordt verwacht dat er tussen de 50 en 100 patiënten baat zullen hebben bij het gebruik van mepolizumab.

Bronnen

Waar terecht? - Stichting Zeldzame Bloedziekten
HES: over de oorzaak en behandeling | Sanquin
Mepolizumab | Horizonscan geneesmiddelen